


HER DANESİ ASİL TOHUM

www.asilgen.com



Asilgen

TARIM HAYVANCILIK SAN. VE TIC.LTD.ŞTİ.

BAŞARININ SIRRI TOHUMLARDA gizli

“ Her tohum bir özlemdir. ”
Her tohumda bir tutku gizlidir.

HAKKIMIZDA

BİZ

Merkezi Konya'da bulunan ASİLGEN Tohum; Yem bitkileri Tarla bitkileri, Endüstri bitkileri, ve Çayır-Mera tohumlarının üretimi, yurtiçi ve yurt dışında pazarlanması ve yeni çeşitler için araştırma-geliştirme (AR-GE) alanlarında faaliyet göstermektedir. Konusunda uzman ziraat mühendisleri ile en kaliteli ve üstün verimli tohumların üretimini yaparak, Türk çiftçisine sunmak ve yurtdışında pazarlar oluşturarak ülke ekonomisine katkıda bulunmak amacı ile kurulmuştur. Sektörünün önde gelen kuruluşları arasında yer alma gayreti ve çabası içerisinde olup, çalışmalarını ve yatırımlarını devam ettirmektedir. %100 yerli tohum üreticisi ve yatırımcısı olarak üstlendiği sorumlulukla Dünya'da birçok tohumun gen merkezi olan Anadolu'da elde edilen her tohum danesi, gelecek ile ilgili ilham kaynağı olacaktır. Üretilen tohumların Dünya tarımında önemli ölçüde tercih edilmesi, Asilgen tarımın en büyük hedefidir.

VİZYON

Sürdürülebilir tarımda üreticilerimizin refah düzeyini artırmak için PROJELER üretmek ve AR-GE çalışmalarımızla, en kaliteli ve yüksek verimli çeşitleri geliştirmek, Uluslar arası önde gelen tohumculuk kuruluşları arasında yer alarak, dış ülkelere de ihracatı ön planda tutan bir kuruluş olmak.



Asilgen

ÇEŞİTLER

NOHUT	AYASLI
NOHUT	HASANBEY
YEM BEZELYESİ	MAHİRBEY
YEM BEZELYESİ	FURKAN
MACAR FİĞ	TARM BEYAZI - 98
KURU FASÜLYE	BERRAK
YONCA	ZÜMRÜT
YONCA	DEFNE
MERCİMEK	TRAGEN 301



Asilgen

ÇEŞİTLER

EKMEKLİK BUĞDAY	TENNUR
EKMEKLİK BUĞDAY	METE 06
EKMEKLİK BUĞDAY	YUNUS
EKMEKLİK BUĞDAY	AYTEN ABLA
MAKARNALIK BUĞDAY	EMİNBEY
MAKARNALIK BUĞDAY	ÇEŞİT-1252
YULAF	DİRİLİŞ
ARPA	ASTEK
ARPA	LARENDE
ARPA	BURAK BEY



Asilgen

ZOBAR MİX

YEM BİTKİLERİ TOHUMLUKLARININ MİX (KARIŞIK) OLARAK EKİLMESİ VE HAYVAN BESLEMEDE KULLANILMASI

Yemler içeriklerinde bulundurdıkları besin maddelerinin konsantrasyonuna göre değer kazanırlar. Sindirilebilir besin maddeleri içeren, selüloz oranı % 18-20 den yüksek yemlere “KABA YEM” denir. Hayvanlara doygunluk vermek, iřkembeyi alıřtırmak ve geviř getirmek için gerekli olan kaba yemler ekonomik ve saėlıklı beslenmenin temel anahtarıdır. Kalitesine baėlı olmakla birlikte oėunlukla hayvanların enerji, protein, vitamin ve mineral ihtiyalarının önemli bir bölümünü kapsar. Rasyon hazırlanırken temel olarak kaba yemler esas alınıp kesif (Hazır Fabrika Yemi) yemin bileřiminin kaba yemin özelliėine göre belirlenmesi gerekir.



ZOBAR MİX



ZOBAR MİX

Ülkemizde kaba yem açığı çok fazladır, bu açığı gidermek için yem bitkileri üzerinde birçok araştırma yapılmıştır. Bu araştırmalarda Macar fiğ ve yem bezelyesinin ot verimi ve beslenme değeri yüksek olan bitkiler olması ayrıca çiftlik hayvanlarınca ince gövdeli ve bol yapraklı olan bu bitkileri severek yemesinden dolayı bu bitkiler üzerinde daha fazla araştırma yapılmıştır. Ayrıca bu bitkiler, toprak yapısını iyileştirmesi ve kendisinden sonra ekilen ürünlerin verimini artırması nedeni ile mükemmel bir münavebe bitkisidir. Macar Fiğ ve yem bezelyesi çok fazla dallanmasından dolayı yatmaktadır, bu durum hem verimi hem de kaliteyi olumsuz etkilemektedir. Yatmayı engellemek için sağlam ve dik gövdeli tahıllarla karıştırılarak ekilmesi gereklidir. Ancak bu farklı türlerin birbirlerini baskılamadan uyumlu bir gelişim göstermesi için karışım oranı ve çeşidi iyi belirlenmelidir.

ZOBAR MİX

Karışım oranları ile ilgili birçok araştırmalar yapılmıştır, bu araştırmalar ışığında dekardaki baklagiller (Macar fiğ - yem bezelyesi) %70 buğdaygiller (yulaf - buğday) % 30 olacak şekilde en uygun karışım oranı tespit edilmiştir. Yem bitkisi tohumlarının karışım halinde ekilmesinde amaçlanan yararları elde edebilmek için karışımı oluşturan türlerin çeşitlerini ve karışımında yer alacak oranlarını çok iyi ayarlamak gerekmektedir. Aksi taktirde karışımından beklenen hedeflere ulaşmak mümkün değildir. 1958 yılından beri karışım ile ilgili yeşil, kuru ot verimi ve ham protein yönü ile birçok araştırmalar yapılmıştır. Bu araştırmalar sonucunda önerilen en uygun karışım oranları ZOBAR MİX’de uygulanmıştır.



NEDEN ZOBAR MİX ?

Tüm tohumlar Mantar İlacı ile kaplanmıştır ve bakteri ile aşılanmıştır.

Yüksek verim kabiliyeti, protein, enerji, vitamin ve minareller ihtiva etmesinden dolayı ekonomik bir yem kaynağıdır.

Hayvanların sindirim organları ve microflorası için gerekli besin maddeleri içerir.

Hayvanların üreme gücünü, döl tutma kabiliyetini artırır.

Hayvansal ürünlerin verim ve kalitesini artırır.

Alışla gelmiş yem bitkileri üretimine kıyasla ZOBAR MİX’de kuru ot verimi % 50 artarken protein, enerji, vitamin ve minerallerce % 20 daha zengin ürün alınır.

Zobar Mix hasat zamanına kadar yatmaz dolayısıyla ürünlerde küflenme olmaz ve kolay hasat yapılır.



EKİM

Bu karışımın ekim normu 16 - 18 kg./da. olmalıdır. Kışlık Ekim; Ekim - Kasım ayları arası en uygun zamandır. En geç ekim, devamlı kıştan 6 hafta önce yapılmalıdır. Baharlık ekim ise Mart'ın sonuna kadar yapılabilir.

Ekimler yazlık ve kışlık olarak yapılabilir ancak maksimum verim kışlık ekimlerden alınabilmektedir. Hububat mibzeri ile ekim yapılır, ekim yapılmadan önce yada sonra toprak, merdane ile mutlaka sıkıştırılmalıdır.

BAKIM

Ekimden sonra yağış olmaz ise mutlaka çıkış suyu verilmelidir. Toprak Analizi dikkate alınmak şartıyla 15-20 kg/da. DAP. Gübresi ile ekim yapılmalıdır. Şubat - Mart ayında 15 - 20 kg üre veya amonyum sülfat (Şeker) gübresi atılmalıdır.

Yağışların yeterli olmadığı durumlarda Nisan - Mayıs aylarında sulanmalıdır.

HASAT

Karışımımız ham protein ve ot verimi dikkate alınarak hazırlanmıştır. Kuru ot için en uygun hasat zamanı yem bezelyesinin alt baklalarının içinde danelerin iz şeklinde belirttiği zamandır. Bu dönemde bitkilerin boyu 1,5-2 mt. arasında olup dekara 800 -1500 kg. kuru ot verir. Protein oranı %18 civarındadır. Silaj yapılacaksa bir gün bekletilerek soldurulur ve silaj yapılabilir. Silaj için biçim zamanı ise taneler baklaları doldurduktan sonra kuru madde oranı %35 olduğu dönemde direk silaj yapılabilir. Dekara yaklaşık 4-5 ton silaj verir.

**ANTRAKNOZA
DAYANIKLI**



**AYASLI
NOHUT**



AYASLI

NOHUT

Tescil Yılı:

2021

Çeşit Sahibi Kuruluş:

Asilgen Tohumculuk

Tarımsal Özellikleri:

Yüksek verimli bir çeşittir. Ortalama 5 - 9 arası dallanır.

Morfolojik Özellikleri:

Bitki boyu 45 - 63 cm, ilk bakla yüksekliği 20 - 35 cm'dir. Büyüme şekli yarı dik ve çiçeklenme gün sayısı 42 - 76 gün fizyolojik olum gün sayısı: 93 - 136 gün 'dür.

Dane Özellikleri:

100 dane ağırlığı 34,8 - 54,6 g, dane rengi Bej ve köşeli – yuvarlak bir yapıdadır.

Verim Özellikleri:

Bakım şartlarına ve iklime göre değişmekle birlikte ortalama verim 190,7 - 461,1 kg arasındadır.

Kalite Özellikleri:

Yemeklik ve leblebik olarak tüketilebilir, su alma kapasitesi (g) 0,42, su alma indeksi (%) 0,97 - 0,98, şişme indeksi (%) 2,24 ve şişme kapasitesi (ml) 0,47'dir. 9 mm'lik elekte 53,5 - 58,0, 8 mm'lik elekte 33,9-38,1'dir.

Hastalık Durumu:

Antraknoz hastalığına orta hassas bir çeşittir.

Yetiştirilmesi ile ilgili tavsiyeler

Dekara kullanılacak tohumluk miktarı iriliğe ve toprak yapısına göre değişmekle birlikte 13-18 kg/da tavsiye edilmektedir. Ekimle birlikte 2-3 kg kadar saf azot ve 5-6 kg/da kadar saf fosfor önerilmektedir.



**ANTRAKNOZA
DAYANIKLI**



HASANBEY
NOHUT



HASANBEY

NOHUT

Tescil Yılı:

2011

Çeşit Sahibi Kuruluş:

Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü

Tür adı:

Nohut (Cicer arietinum L.)

Tarımsal Özellikleri:

Yüksek verimli bir çeşittir. Baklalardan çift çıkma oranı %65'tir. Ortalama 5 – 9 arası dallanır.

Morfolojik Özellikleri:

Bitki boyu 32 – 86 cm, ilk bakla yüksekliği 15 – 27cm, bitki büyüme şekli yarı dik, çiçeklenme gün sayısı 30 – 75 gün fizyolojik olum gün sayısı 80 – 146'dır.

Dane Özellikleri:

100 dane ağırlığı 43,7 – 46,5 g, dane rengi sarı, köşeli ve yuvarlaktır.

Verim Özellikleri:

Dekara ortalama verimi 199,6 – 469,1 kg arındadır.

Kalite Özellikleri:

Yemelik ve leblebik olarak kullanılabilen kaliteli bir çeşittir. Su alma kapasitesi (g) 0,41 – 0,50, su alma indeksi (%) 0,86 – 1,08, şişme indeksi (%) 2,11 – 2,43, şişme kapasitesi (ml) 0,37 – 0,51'dir. 9 mm elekte (%) 19,5 – 48,8 ve 8 mm elekte (%) 41,6 – 77,3'tür.

Hastalık Durumu:

Antraknoz hastalığına dayanıklıdır.

Yetiştirilmesi ile ilgili tavsiyeler:

Aralık ayında ekilmesi tavsiye edilmektedir. Dekara atılacak tohum miktarı iriliğine göre değişmekle birlikte 13 – 18 kg arasında tohum kullanılabilir. Ekimle birlikte dekara 2 – 3 kg saf azot ve 5 – 6 kg fosfor atılması tavsiye edilmektedir.





MAHİRBEY

YEM BEZELYESİ



MAHİRBEY

YEM BEZELYESİ

Tescil Yılı:

2017

Çeşit Sahibi Kuruluş:

Asilgen Tohumculuk

Tarımsal Özellikleri:

Tek yıllık bir çeşittir. Olgunlaşma geçici bir çeşittir. Ortalama yeşil ot verimi dekara 4.523 kg ve Kuru ot verimi dekara 1.109 kg

Morfolojik Özellikleri:

Bitki boyu çok uzun (130 – 160 cm), kardeşlenme özelliği ve yan dal oluşumu çok iyidir.

Kalite Özellikleri:

Ham protein (%) 14 – 20, Ham selüloz (%) 34,59, Ham yağ (%) 1,5 Kuru madde 92,27, NDF 40 – 48, ADF 30 – 40, NYD 120 – 150

Yetiştirilmesi ile ilgili tavsiyeler:

Güney Marmara, Trakya, İç Ege, İç Anadolu ve Geçit Bölgelerinde ekilmesi tavsiye edilmektedir.





FURKAN

YEM BEZELYESİ



FURKAN

YEM BEZELYESİ

Tescil Yılı:

2008

Çeşit Sahibi Kuruluş:

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Tarımsal Özellikleri:

Tek yıllık bir çeşittir. Olgunlaşma geçci bir çeşittir. Ortalama yeşil ot verimi dekara 4.523 kg ve Kuru ot verimi dekara 1.109 kg. Dane verimi ortalama 350 kg'dır.

Morfolojik Özellikleri:

Bitki boyu çok uzun (130 – 160 cm), çiçek rengi kırmızimsı ve mor, kardeşlenme özelliği ve yan dal oluşumu çok iyi olup, 7 – 10 adet sap oluşturabilir. Kışa dayanımı yüksek bir çeşittir.

Kalite Özellikleri:

Ham protein (%) 14 – 20, Ham selüloz (%) 34,59, Ham yağ (%) 1,5 Kuru madde 92,27, NDF 40 – 48, ADF 30 – 40, NYD 120 – 150

Yetiştirilmesi ile ilgili tavsiyeler:

Güney Marmara, Trakya, İç Ege, İç Anadolu ve Geçit Bölgelerinde ekilmesi tavsiye edilmektedir.





TARM BEYAZI - 98

MACAR FİĞ



TARM BEYAZI - 98

MACAR FİĞ

Tescil Yılı:

2013

Çeşit Sahibi Kuruluş:

Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü

Tarımsal Özellikleri:

Kışa dayanması oldukça iyidir. Kurağa dayanmayı oldukça iyidir. Çiçeklenme gün sayısı 176 – 204 ve fizyoloji olum gün sayısı 222 – 241 dir.

Morfolojik Özellikleri:

Bitki boyu 74,2 cm olup doğal bitki boyu 43 – 53 cm arasındadır. Ana sap kalınlığı 2 – 3 mm'dir. Bitkideki ana sap sayısı 2 – 4'tür. Beyaz çiçeklidir. Yarı yatık bir çeşittir.

Dane Özellikleri:

1000 dane ağırlığı 32,9 g'dır.

Verim Özellikleri:

Yeşil ot verimi dekara 1773,7 kg olup standart çeşitlere göre %5,7 daha fazladır. Kuru ot verimi dekara 489,6 kg 'dır.

Kalite Özellikleri:

Ot kalitesi iyi ve kuru madde %13,4 – 16 arasında değişmektedir.

Yetiştirilmesi ile ilgili tavsiyeler:

Ekim zamanı son bahar yağışlarından sonra ekim kasım aylarıdır. İlkbahar ekiminde ise olabildiğince erken ekim yapılmalıdır. Fığların sapları zayıf olduğundan, sülükleri ile tutunarak gelişmektedirler. Bunun içinde tahıl türleri veya diğer buğdaygillerle yetiştirilirler. Sıraya ekimde dekara 8 – 10 kg tohum atılması gerekmektedir. Serpme ekim yapılacaksa 12 – 15 kg tohum kullanılması gerekmektedir.





BERRAK

KURU FASÜLYE



BERRAK

KURU FASÜLYE

Tescil Yılı:

2013

Çeşit Sahibi Kuruluş:

Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü

Tarımsal Özellikleri:

%50 çiçeklenme gün sayısı, 45-60 gün, olgunlaşma gün sayısı 86-106 gün, orta erkenci, yarı sarılıcı bitki tipindedir.

Morfolojik Özellikleri:

Bitki boyu 34-87 cm, ilk bakla yüksekliği 9-17cm.

Dane Özellikleri:

Dane rengi beyaz, dane tipi çalı ve 100 dane ağırlığı 25,7-33,7 g.

Verim Özellikleri:

Dekara dane verimi 250 - 427 kg arasındadır.

Kalite Özellikleri:

Ham protein oranı %19.2-25.0 arasında ve pişme süresi 36-42 dk.

Yetiştirilmesi ile ilgili tavsiyeler:

Orta Anadolu Bölgesinde ve Geçit Bölgelerinde yetiştirilmesi tavsiye edilmektedir.



ZÜMRÜT

YONCA



ZÜMRÜT

YONCA

Tescil Yılı:

2020

Çeşit Sahibi Kuruluş:

Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

Tarımsal Özellikleri:

6317 kg/da yeşil ot verimi ile standart ortalama verimden %6,4 daha fazla, 1593 kg/da kuru ot verimi ile standart ortalamadan %6,5 daha fazladır.

Morfolojik Özellikleri:

Bitki boyu ortalama 65.8 cm'dir. Salkım şeklindeki çiçekler mor renktedir. Meyve 2-3 bazen 4 kıvrımlıdır.

Dane Özellikleri:

Tohumların şekli böbrek, yumurta, eldiven, kalp ve yarım kalp olarak çeşitlilik göstermektedir. Tohum rengi ise açık ve koyu taba ile açık ve koyu sarıdır.

Kalite Özellikleri:

%10 çiçeklenme devresinde hasat edildiğinde kuru otunda, ham protein %19,6, ham selüloz %33,5, kuru madde %93,2, ham yağ %2,3, NDF %42,5, ADF %34,1, ADL %9,8, ve NYD 136'dır.





DEFNE

YONCA



DEFNE

YONCA

Tescil Yılı:

2020

Çeşit Sahibi Kuruluş:

Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

Tarımsal Özellikleri:

6851 kg/da yeşil ot verimi ile standart ortalama verimimden %15,4 daha fazla, 1717 kg/da ortalama kuru ot verimi ile standartlardan %14,8 daha fazladır.

Morfolojik Özellikleri:

Bitki boyu ortalama 68.8 cm'dir. Salkım şeklinde çiçekleri mor renktedir. Meyve 2-3 bazen de 4 kıvrımlı olmaktadır.

Dane Özellikleri:

Tohumların şekli böbrek, yumurta, eldiven, lap ve yarım kalp olarak çeşitlilik göstermektedir. Tohum rengi ise koyu ve açık taba ile koyu açık sarıdır.

Kalite Özellikleri:

Ham protein %19,63, ham selüloz %28,99, kuru madde %93,55, ham yağ %2,24, NDF %40,87, ADF %31,17, ADL 8,50 ve NYD 147





MERCİMEK

TRAGEN 301



MERCİMEK

TRAGEN 301 Kırmızı Mercimek Tohumu

Tescil Yılı:

2021

Çeşit Sahibi Kuruluş:

Asilgen Tohumculuk

Morfolojik Özellikleri:

Bitki boyu(cm) 33 – 56 cm arasında ve ilk bakla yüksekliği (cm) 14 -27 cm arasındadır.

Dane Özellikleri:

1000 dane ağırlığı (g) 26,8 – 39,1'dir.

Verim Özellikleri:

Bakım ve iklime dayalı olarak dekara verim değışmekle birlikte ortalama 164,2 kg'dır.

Kalite Özellikleri:

Su alma kapasitesi(g) 0,024 – 0,033, su alma indeksi (%) 0,79 – 0,95 ve şişme indeksi (%) 1,77 – 1,84 arasındadır. 5 mm elek üstü değeri (%) 1,5, 4,5 mm elek üstü değeri %7,9 ve 4 mm'lik elek değeri ise %12,9 – 59,5 arasındadır.





TENNUR

EKMEKLİK BUĞDAY



TENNUR

EKMEKLİK BUĞDAY

Tescil Yılı:

2023

Çeşit Sahibi Kuruluş:

Asilgen Tohumculuk

Tarımsal Özellikleri:

Ortalama 100-136 cm arasında boylanabilen, yatmaya dayanıklı, kışa ve yatmaya dayanıklıdır, sap verimi yüksektir ve hastalıklara toleransı iyi olan alternatif bir çeşittir.

Morfolojik Özellikleri:

Kılçıksız, beyaz başaklı ve kırmızı danelidir.

Dane Özellikleri:

1000 dane ağırlığı 36,5'dir.

Verim Özellikleri:

Verim düzeyi çevre şartları ve bakım durumuna bağlı olarak 600-880 kg/da arasında değişir.

Kalite Özellikleri:

Hektolitreye ağırlığı 78,60 kg, Protein oranı %1148, Sertlik oranı %81,2'dir Ekmeklik kalitesi yüksek.

Yetiştirilmesi ile ilgili tavsiyeler:

Orta Anadolu ve Geçit Bölgeleri'nde sulanabilen alanlarda iyi yetiştiricilik şartları için önerilir. Yüksek verim ve kaliteli ürün için ideal bir çeşittir.





METE 06

EKMEKLİK BUĞDAY



METE 06

EKMEKLİK BUĞDAY

Tescil Yılı:

2022

Çeşit Sahibi Kuruluş:

Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü

Tarımsal Özellikleri:

Orta erkencidir, Kışa ve yatmaya dayanıklıdır.
Başak kırmızı ve kılçıklıdır. Dane kırmızı ve serttir.

Verim Özellikleri:

1000 dane ağırlığı 31,0-37,0 kg
Verim düzeyi çevre şartları ve bakım durumuna bağlı olarak değişmektedir.
Ortalama 583,7 kg/da arasında değişir.

Kalite Özellikleri:

Hektolitire ağırlığı 76.1-77.5 kg, Protein oranı %14,9-16,4, Sedimentasyonu 55-69 ml, Alveograf enerji değeri 376-380, Su absorpsiyonu %13.0, Un verimi %69,2-72,7, Yaş gluten %380, Kuru gluten %31,6 ve Gluten indeksi %97,1-97,9 'dir.

Tavsiye Edilen Bölgeler:

Orta Anadolu ve Geçit Bölgelerde kıraç ve sulana bilen arazilerde. Yüksek verim ve kaliteli ürün için ideal bir çeşittir.





YUNUS

EKMEKLİK BUĞDAY

Yunus Buğdayın diğer buğdaylardan üstün yönü sap yönüyle Dünya'nın en uzun ve kılçıksız ekmeçlik buğdayı olmasıdır, Yatmaya karşı dayanaklıdır. Silaj verimi yönüyle dünyanın en verimli buğdayıdır.



YUNUS

EKMEKLİK BUĞDAY

Tescil Yılı:

2012

Çeşit Sahibi Kuruluş:

Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü

Tarımsal Özellikleri:

Orta erkencidir, Kışa ve yatmaya dayanıklıdır, Sap verimi yüksektir.

Morfolojik Özellikleri:

Başak beyaz ve kılıksızdır. Dane kırmızı ve serttir. Bitki boyu 110-115 cm'dir.

Dane Özellikleri:

1000 dane ağırlığı 38-41 kg

Verim Özellikleri:

Verim düzeyi çevre şartları ve bakım durumuna bağlı olarak 600-820 kg/da arasında değişir.

Kalite Özellikleri:

Hektolitre ağırlığı 78-80 kg, Protein oranı %12,5-14, Sedimentasyonu 42-46 mi Ekmeklik kalitesi yüksek.

Hastalık ve Zararları:

Doğal epidemi koşullarında bölgenin önemli hastalıklarından sarı pasa dayanıklı, kara pas ve sürmeye orta duyarlıdır.

Tavsiye Edilen Bölgeler:

Orta Anadolu ve Geçit Bölgeleri'nde sulanabilen alanlarda iyi yetiştiricilik şartları için önerilir. Yüksek verim ve kaliteli ürün için ideal bir çeşittir.



**KURAKLIĞA
DAYANIKLI**



AYTEN ABLA
EKMEKLİK BUĞDAY



AYTEN ABLA

EKMEKLİK BUĞDAY

Tescil Yılı:

2019

Çeşit Sahibi Kuruluş:

Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü

Tarımsal Özellikleri:

Orta erkencidir, Kışa ve yatmaya dayanıklıdır, Sap verimi yüksektir.

Morfolojik Özellikleri:

Başak kırmızı ve kılçıklıdır. Dane kırmızı ve serttir. Bitki boyu 86-110 cm'dir.

Dane Özellikleri:

1000 dane ağırlığı 29,4-35,3 kg

Verim Özellikleri:

Verim düzeyi çevre şartları ve bakım durumuna bağlı olarak 495-1100 kg/da arasında değişir.

Kalite Özellikleri:

Hektolitre ağırlığı 76,1-80,7 kg, Protein oranı %12,3-16,4, Sedimentasyonu 32-61 ml, Alveograf enerji değeri 167-280, Su absorpsiyonu %58,2-60,8, Un verimi %63,0-72,4, Yaş gluten %34,5-42,9, Kuru gluten %11,4-14,1 ve Gluten indeksi %58,5-66,7 'dir. Ekmeklik kalitesi yüksek.

Yetiştirilmesi ile ilgili tavsiyeler

Orta Anadolu ve Geçit Bölgelerde kışa ve sulana bilen arazilerde. Yüksek verim ve kaliteli ürün için ideal bir çeşittir.





EMİNBİY

MAKARNALIK BUĞDAY



EMİNBİY

MAKARNALIK BUĞDAY

Tescil Yılı:

2009

Çeşit Sahibi Kuruluş:

Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü

Tarımsal Özellikleri:

Kış gelişim tabiatında soğuğa ve kışa dayanıklılığı iyi yatmaya dayanıklılığı yüksek, kardeşlenmesi iyi ve orta erkenci bir çeşittir. Gübreye reaksiyonu iyidir. Dane dökmeyen ve harman olma kabiliyeti iyi olan bir çeşittir.

Morfolojik Özellikleri:

Kılıçlıklı ve beyaz başaklı, başaklar orta uzun, orta sık ve dik bir yapıda, orta boylu ve sağlam saplıdır.

Dane Özellikleri:

1000 dane ağırlığı 38 – 42 g

Verim Özellikleri:

Çevre şartlarına ve bakım durumuna bağlı olarak verim düzeyi kurak alanlarda dekara 220 – 350 kg iken sulu şartlarda 350 – 750 kg olmaktadır.

Kalite Özellikleri:

Hektolitre ağırlığı 79 – 84 kg, Protein oranı %12,5 – 17,6

Hastalık ve Zararları:

Sarı ve kara pasa orta hassastır.

Yetiştirilmesi ile ilgili tavsiyeler:

İç Anadolu ve Geçit bölgeleri ve benzer yörelerin taban ve yarı taban alanlarında 1 – 15 Ekim tarihleri arasında 4 – 5 cm toprak derinliğine dekara 20 – 22 kg tohum kullanılarak ekim yapılması tavsiye edilmektedir.





ÇEŞİT-1252

MAKARNALIK BUĞDAY



ÇEŞİT-1252

MAKARNALIK BUĞDAY

Tescil Yılı:

1991

Çeşit Sahibi Kuruluş:

Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü

Tarımsal Özellikleri:

Yabancı otlar ile rekabeti iyi, soğuğa ve kışa dayanımı yüksek, yatmaya dayanıklı, Kardeşlenmesi orta ve gübre reaksiyonu oldukça iyi.

Morfolojik Özellikleri:

Kılçıklı ve kahverengi kavuzlu, başaklar orta – uzun , orta – sık ve eğik bir yapıda, orta boylu ve sağlam bir sap yapısındadır.

Dane Özellikleri:

1000 dane ağırlığı 38 – 42 g

Verim Özellikleri:

Kuru koşullarda dekara verim 300 – 350kg iken sulu koşullarda 450 – 600 kg'dır.

Kalite Özellikleri:

Hektolitre ağırlığı (kg/hl) 75 – 78, camsılık oranı (%) 70 – 90, SDS değeri 15 – 21 arasındadır. Uygun yetiştirme koşullarında makarnalık kalitesi iyidir.

Hastalık ve Zararları:

Sarı pasa orta hassas, rastık ve süremeye dayanıklıdır.

Yetiştirilmesi ile ilgili tavsiyeler:

İç Anadolu ve Geçit bölgelerinde su stresinin olmadığı yarı taban, taban ve sulama alanlarında verim potansiyeli çok yüksektir. 1 – 15 Ekim tarihleri arasında 4 – 5 cm derinlikte dekara 20 – 22kg tohum düşecek şekilde ekim yapılması tavsiye edilmektedir.



KURAKLIĞA
SOĞUĞA
DAYANIKLI



DİRİLİŞ
YULAF



DİRİLİŞ

YULAF

Tescil Yılı:

2017

Çeşit Sahibi Kuruluş:

Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

Morfolojik Özellikleri:

Beyaz renkli, kavuzlu, bitki boyu 90 - 130 cm arasında

Dane Özellikleri:

1000 dane ağırlığı 29 - 33 g

Verim Özellikleri:

Bakım şartlarına ve iklime bağlı olarak, kuru koşullarda ortalama 450 kg/da 'dır.

Kalite Özellikleri:

Protein oranı (%) 11 - 17, Hektolitre ağırlığı (kg) 37 - 55, Ham yağ oranı (%) 4 - 6'dır.

Hastalık ve Zararları:

Yulaf taçlı pas hastalığına dayanıklıdır.

Tavsiye Edilen Bölgeler:

1 - 15 Ekim tarihleri arasında 22 - 23 kilo tohum kullanılabilir. Orta Anadolu Geçit Bölgelerinde Tavsiye Edilmektedir.



**YÜKSEK VERİMLİ
6 SIRALI
ÇEŞİDİMİZ**



ASTEK
ARPA



ASTEK

ARPA

Tescil Yılı:

2022

Çeşit Sahibi Kuruluş:

Asilgen Tohumculuk

Tarımsal Özellikleri:

Alternatif gelişme tabiatında bitki boyu 97 cm. uzunluğunda olup, kuraklığa ve soğuğa orta dayanıklıdır. Yatmaya karşı dayanıklıdır.

Morfolojik Özellikleri:

6 sıralı bir yapıya sahiptir.

Verim Özellikleri:

Ortalama dekara verim 600 kg'dır.

Hastalık ve Zararları:

Pas hastalığına karşı toleranslıdır.

Yetiştirilmesi ile ilgili tavsiyeler:

Orta Anadolu ve Geçit Bölgelerinde yetiştirilmesi tavsiye edilmektedir.





LARENDE

ARPA



LARENDE

ARPA

Tescil Yılı:

2006

Çeşit Sahibi Kuruluş:

Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

Tarımsal Özellikleri:

Bitki boyu 100 – 110 cm olup kurağa ve soğuğa orta dayanıklıdır. Yatmaya karşı hassastır. Eş zamanlı olgunlaşma özelliğine sahip, kardeşlenme kapasitesi yüksek olan bir çeşittir.

Morfolojik Özellikleri:

2 sıralı beyaz kılıçlı bir arpaya sahiptir.

Dane Özellikleri:

1000 dane ağırlığı 41 – 48 g.

Verim Özellikleri:

Ortalama dekara verim 450 – 950 kg arasındadır.

Kalite Özellikleri:

Protein oranı (%) 10 -13 ve Hektolitre ağırlığı (kg) 63 – 68 dir. Kullanım alanı yemliktir.

Hastalık ve Zararları:

Arpa yaprak lekesi ve arpa çizgili yaprak lekesine orta hassastır.

Yetiştirilmesi ile ilgili tavsiyeler:

Orta Anadolu Geçit Bölgelerinde 1 – 15 Ekim tarihleri arasında 4 – 5 cm ekim derinliğinde dekara 18 – 20 kg tohum atılmalıdır.



BURAKBEY

ARPA



BURAKBEY

ARPA

Tescil Yılı:

2013

Çeşit Sahibi Kuruluş:

Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü

Tarımsal Özellikleri:

Sağlam saplı yatmaya dayanıklı, kardeşlenme kapasitesi yüksek, suya ve azota tepkisi iyi, eş zamanlı olgunlaşmaya sahip, başaklanma zamanı orta, başak kırıcılığı olmayan ve kolay harmanlanabilen, yüksek verimli bir çeşittir.

Morfolojik Özellikleri:

2 sıralı kılçıklı, uzun başaklı, kavuzlu – beyaz daneli, ince uzun yapraklı ve bitki boyu 90 – 100 cm'dir.

Dane Özellikleri:

1000 dane ağırlığı 40 – 45 g.

Verim Özellikleri:

Kuru koşullarda dekara ortalama verim 350 – 450 kg'dır.

Kalite Özellikleri:

Protein oranı (%) 10 – 12, Elek üstü (2,5 mm <) % 85, ve biyolojik değeri orta (%) 74,9'dur.


Hastalık ve Zararları:

Arpa yaprak lekesi ve arpa çizgi yaprak lekesi hastalıklarına orta dayanıklıdır.

Yetiştirilmesi ile ilgili tavsiyeler:

İç Anadolu ve Geçit Bölgelerinin yarı taban ve kıraç alanlarına tavsiye edilir.





Asilgen

TARIM HAYVANCILIK SAN. VE TIC.LTD.ŞTİ.



+90 530 355 64 08



+90 (332) 502 06 00



İstiklal OSB Mh. Azerbaycan Cd.

No: 12/1-2 Çumra / KONYA

Fevzi Çakmak Mh. 10502 Sk.

No: 1 Karatay / KONYA



info@asilgen.com

www.asilgen.com